



వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు సరాల క్షీణత వ్యాధులకు దారితీస్తాయా? CCMB అధ్యయనం వెల్లడి

ఇటీవలి కాలంలో వెలువడుతున్న అనేక అధ్యయనాలు **ఇన్ఫ్ల్యుయెంజా మరియు కోవిడ్-19** వంటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లకు **పార్కిన్సన్ వ్యాధి** వంటి న్యూరోడిజెనరేటివ్ వ్యాధుల ప్రమాదం పెరగడానికి మధ్య సంబంధం ఉందని సూచిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ సంబంధానికి కారణమయ్యే పరమాణు స్థాయి యంత్రాంగాలు (molecular mechanisms) ఇప్పటికీ పూర్తిగా స్పష్టంగా తెలియలేదు.

ఇన్ఫ్ల్యుయెంజా మరియు కోవిడ్-19 రెండూ **RNA వైరస్**ల వల్ల కలిగే ఇన్ఫెక్షన్లు. ఈ వైరస్లు తమ జన్యు సమాచారాన్ని DNAకి బదులుగా **RNA** రూపంలో కలిగి ఉంటాయి. హైదరాబాద్‌లోని ****CSIR-సెంటర్ ఫర్ సెల్యులర్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ (CCMB)****లో డా. స్వస్తి రే చౌధురి ప్రయోగశాల ఇటీవల నిర్వహించిన ఒక అధ్యయనం *Cell Reports* జర్నల్‌లో ప్రచురితమైంది. ఈ అధ్యయనం RNA వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్లు న్యూరోడిజెనరేషన్‌కు దారితీసే పరమాణు మార్పులను ఎలా ప్రేరేపిస్తాయో పరిశీలించడంతో పాటు, ఈ నష్టాన్ని నిరోధించే ఒక పరమాణు రక్షణ వ్యవస్థను కూడా గుర్తించింది.

న్యూరోడిజెనరేటివ్ వ్యాధుల ప్రధాన లక్షణాలలో ఒకటి మెదడులో **Amyloid (ప్రోటీన్ నిక్షేపాలు)** ఏర్పడటం. ఇవి ప్రోటీన్లు ఒకదానితో ఒకటి సమూహంగా చేరి ఏర్పడే అసాధారణ నిక్షేపాలు. ఈ అమైలాయిడ్స్ న్యూరాన్ల మధ్య సమాచార ప్రసారానికి ఆటంకం కలిగించి, నాడీకణాల సాధారణ పనితీరును దెబ్బతీస్తాయి. అలాంటి ప్రోటీన్లలో ఒకటైన **α -Synuclein (ఆల్ఫా-సైన్యూక్లీన్)**, పార్కిన్సన్ వ్యాధితో బాధపడుతున్న వ్యక్తుల మెదడులో అమైలాయిడ్లను ఏర్పరుస్తుంది. RNA వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ **α -Synuclein** అమైలాయిడ్ ఏర్పడటాన్ని ఎలా పెంచగలదో ఈ కొత్త అధ్యయనం పరిశీలించింది.


RNA వైరస్లు తమ జన్యు పదార్థమైన RNAను **ద్వితీయ నిర్మాణాల్లో (secondary structures)** భద్రపర్చుకుంటాయి. వైరల్ RNAలు కేవలం దారం లాంటి సరళమైన అణువులు కావు; అవి ప్రత్యేకమైన త్రిమితీయ (3D) నిర్మాణాలను ఏర్పరుస్తాయి. వీటిలో **RNA G-quadruplexes (rG4s)** అనే నిర్మాణాలు ముఖ్యమైనవి. కణాలను వైరస్లు ఇన్ఫెక్ట్ చేసినప్పుడు, ఈ ప్రత్యేక ద్వితీయ నిర్మాణాలు **α -సైన్యూక్లీన్**కు అంటుకుని, అమైలాయిడ్ ఏర్పడే ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తాయి. దాంతో **α -Synuclein** అమైలాయిడ్ వేగంగా ఏర్పడతాయి. ఈ, అమైలాయిడ్స్ పార్కిన్సన్ వ్యాధికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన లక్షణాలలో ఒకటి.

అయితే, వైరస్‌కు వ్యతిరేకంగా ఇన్ఫెక్ట్ అయిన కణాల్లో ఒక రక్షణ వ్యవస్థ కూడా పనిచేస్తుంది. ఇన్ఫెక్షన్‌కు ముందు సాధారణంగా కణంలోని కేంద్రకం (nucleus) లో ఉండే **DDX39A అనే helicase ప్రోటీన్**, ఇన్ఫెక్షన్ తర్వాత సైటోప్లాస్మాలోకి (cytoplasm) విడుదలవుతుంది. అక్కడ ఇది **α -Synuclein** మరియు rG4s రెండింటితోనూ అనుసంధానమై, DDX39A వైరల్ rG4 నిర్మాణాలను **విడదీసి (unwind)**, వైరస్‌కు వ్యతిరేకంగా కణానికి ఒక రక్షణను అందిస్తుంది.

వైరల్ RNA నిర్మాణాలు విడదీయబడినప్పుడు వైరస్ తన ప్రతిరూపాలను తయారు చేసుకోవడంలో విఫలమవుతుంది. ఫలితంగా కణాల్లో వైరల్ లోడ్ తగ్గుతుంది. అదే సమయంలో, వైరల్ RNA యొక్క ద్వితీయ నిర్మాణాన్ని విడదీయడం వల్ల α -Synuclein అమైలాయిడ్ ఏర్పడే ప్రక్రియ కూడా నెమ్మదిస్తుంది అని ఈ అధ్యయనం యొక్క మొదటి రచయిత ఆంచల్ వివరించారు.

కణాల్లో వివిధ అణువుల మధ్య ఒక సున్నితమైన సమతుల్యత ఉంటుంది. జీవంలోని ప్రతి ప్రక్రియలాగే, ఈ **జీవ అణువుల పరస్పర చర్యల్లో (biomolecular interactions)** కూడా ఒక సమతుల్యత ఉంటుంది. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లను నిరోధించడానికి, అమైలాయిడ్ ఏర్పడకుండా కాపాడటానికి కణాల్లో రక్షణ వ్యవస్థలు ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని పరిస్థితుల్లో ఒక రకమైన ప్రతిచర్యకు మరొకదానికంటే ఎక్కువ అనుకూలత ఏర్పడవచ్చు. ఈ సమతుల్యతే కణాల్లో చివరకు ఏ పరిణామం జరుగుతుందో నిర్ణయిస్తుంది. అందువల్ల, ప్రతి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ తప్పనిసరిగా అమైలాయిడ్ ఏర్పడటాన్ని లేదా న్యూరోడిజెనరేటివ్ వ్యాధిని పెంచుతుందని చెప్పలేం. అయితే, తరచుగా వైరస్‌కు గురికావడం వల్ల ఈ సమతుల్యత మనకు ప్రతికూలంగా మారే అవకాశం ఉంది, అని డా. స్వస్తి రే చౌధురి వివరించారు.

డా. స్వస్తి రే చౌధురి ప్రయోగశాల ప్రస్తుతం ఒక సాధారణ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎలా నిశ్శబ్దంగా, అనేక సంవత్సరాల తర్వాత **పార్కిన్సన్ వ్యాధికి దారితీసే పరిస్థితులకు పునాది వేయగలదో** మరింత లోతుగా అర్థం చేసుకోవడానికి పరిశోధనలు కొనసాగిస్తోంది.



చిత్రం 1: SARS-CoV-2 ద్వారా ఇన్ఫెక్ట్ అయిన న్యూరాన్లు — మజెంటా రంగులో, వైరల్ RNA — టీల్ రంగులో, మరియు α -Synuclein అగ్రిగేట్లు — పసుపు రంగులో చూపబడ్డాయి.



చిత్రం 2: ఆంచల్ (ఎడమ) మరియు డాక్టర్ స్వస్తి రే చౌధురి (కుడి)